

Das Nickende Weidenröschen (*Epilobium nutans*) weiterhin im Schwarzen Moor

Klaus SPITZL & Thomas GREGOR

Das Nickende Weidenröschen kommt weiterhin an mindestens zwei Standorten im Randbereich des im Bayerischen Teil der Hochrhön gelegenen Schwarzen Moores vor. Ein Fundort wurde 1997 vom Erstautor in der Nähe des Moorweges in Niedermoor auf 780 m ü. NN am östlichen Randgehänge des Moores ermittelt (TK25 5426/34, Rechts-Hoch-Wert 3575914/5598246). Von Joachim JENRICH wurde im Juli 1995 ein ihm unbekanntes *Epilobium* am Südrand des Schwarzen Moores fotografiert, wobei es sich ebenfalls um *Epilobium nutans* handelte. Weitere Vorkommen der Art im Randbereich des Schwarzen Moores erscheinen möglich. Bereits GIES (1972, Tabellen 9 und 11) gibt die Art in 7 von 21 Vegetationsaufnahmen des Caricetum rostratae und des Junco-Molinietum aus dem östlichen, südöstlichen, südlichen, südwestlichen und westlichen „Niedermoorstufenkomplex“ des Moorrandbereiches an. Diese Angaben fehlen in der Übersicht von GREGOR (1995) über Vorkommen des Nickenden Weidenröschens in der Rhön.

Der Randbereich des Schwarzen Moores wurde insbesondere im Norden durch den Bau der Hochrhönstraße, Entwässerungen, Fichten-Aufforstungen und wahrscheinlich auch durch die Aufgabe der landwirtschaftlichen Nutzung in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Zumindest im Nordteil des Moores, im Bereich des Querenbrunnens (siehe GREGOR 1995), wurden dabei auch Vorkommen von *Epilobium nutans* vernichtet. Die verbliebenen Vorkommen dürften durch die langsam fortschreitende Gehölzsukzession im Moorrandbereich eventuell gefährdet sein. Eine genaue Aufnahme der Vorkommen des Nickenden Weidenröschens im Schwarzen Moor erscheint ange-
raten.



Abbildung 1: Nickendes Weidenröschen (*Epilobium nutans*) im südlichen Randbereich des Schwarzen Moores in der Nähe des Eisgrabens. Foto: Joachim JENRICH, Juli 1995.

Literatur

- GIES, T. 1972: Vegetation und Ökologie des Schwarzen Moores (Rhön) unter besonderer Berücksichtigung des Kationenhaushaltes. – Diss. Botan. 20, 184 S., 12 Tab., Lehre.
- GREGOR, T. 1995: Das Nickende Weidenröschen (*Epilobium nutans*) in der Rhön. – Beitr. Naturk. Osthessen 31, 99-100, Fulda.

Anschrift der Verfasser:

KLAUS SPITZL
Auweg 9
97656 Oberelsbach

Dr. THOMAS GREGOR
Siebertshof 22
36110 Schlitz