

Errata zu Kochia 3

H. SCHOLZ: Die Gattung *Bromus* (*Poaceae*) in Mitteleuropa. Synopse und tabellarischer Bestimmungsschlüssel (Kochia 3: 1–18)

Seite 12, Tabelle:

Bei *Bromus secalinus* muss beim Merkmal „Granne fehlend oder rudimentär“ der Punkt in Klammern stehen.

Seite 13, Tabelle:

- (1) „hervortretend“ aus dem Kopf der 2. Spalte gehört zur 3. Spalte
- (2) „nicht hervortretend“ aus dem Kopf der 3. Spalte gehört zu 4. Spalte.
- (3) "oder schwach winkelig" aus dem Kopf der 5. Spalte gehört zur 6. Spalte
- (4) Punkt in der 1. und 3. Spalte der 4. Zeile gehört in die 2. Spalte (1. & 3. Spalte ohne Punkt)

T. GREGOR & R. HAND (ed.): Chromosomenzahlen von Farn- und Samenpflanzen aus Deutschland 3 (Kochia 3: 55–60)

Seite 56, 56. Meldung zu *Centaurea stoebe* subsp. *australis*:

Die Samen wurden auf Sandfeldern im Süden von Lorsch (nicht Lorch) gesammelt.

T. GREGOR: Typisierungen in der *Potentilla-collina*-Gruppe (*Potentilla* subgex *Collinae* TH. WOLF). 1. Teil: Sippen ohne Zackenhaare (Kochia 3: 61–73)

Seite 69, linke Spalte, 1. Absatz:

Die Formulierung „Das Vorkommen [von *Potentilla rhenana*] im Ahrtal ist mittlerweile erloschen“, ist missverständlich. Nach brieflicher Mitteilung von Dieter Korneck vom Mai 2009 wurde das Vorkommen – bis auf eine Pflanze – bei Ausbesserungen des Weges im Jahre 2008 vernichtet. Am 19.9.2008 wurden 20 Pflanzen dort ausgepflanzt, die im Botanischen Garten Bonn von diesem Vorkommen nachgezogenen worden waren. Am 29.4.2009 waren 10 dieser Pflanzen sowie das aus dem ursprünglichen Vorkommen verbliebene Exemplar noch vorhanden.

R. HAND & K. P. BUTTLER: Taxonomische und nomenklatorische Neuigkeiten zur Flora Deutschlands 3 (Kochia 3: 97–103)

Seite 98, Merkmalstabelle: Wuchsform der Sprosse:

Hier wurden die Merkmale vertauscht, die richtige Zuordnung ist:

bulbosus

kochii

Wuchsform der Sprosse

zumindest ältere
niederliegend oder kriechend

fast alle aufrecht