

1. Teil der elektronischen Beilage zu Bernhardt, K.-G. & Gregor, T. 2019: Vielfalt aus aller Welt – neophytische T. -Arten in Mitteleuropa. – Kochia 12: 9–113, Berlin.

	Gesamthöhe [m]	Breite Blattspreite [mm]	Länge ♂ Kolben [cm]	Haare der ♂ Blüten	Staubblätter je Blüte	Staubbeutelänge (entleert) [mm]	Pollen zusammen	Abstand ♀ und ♂ Kolbenabschnitt [cm]
<i>T. orientalis</i>	1,3-2	4-9	2,7-9	an der Spitze verbreitert	(2-)3(-4)	ca. 2	1	0
<i>T. latifolia</i>	1-2,5	(6-)10-20(-25)	(6-)10-15(-30)	tlw. gegabelt	2-3	2-2,5	4	0(-0,5)
<i>T. shuttleworthii</i>	1-1,5(-1,9)	(5-)7-10(-14)	(2,5-)4-6(-9)	schmal lanzettlich verbreitert	(1-)2(-5)	1,5-1,8(-2,2)	4	0
<i>T. minima</i>	0,5-1	1-2(-4)	2,5-4,5	fehlen	1(-2)	1-1,7(-2,3)	4	(0-)0,7(-2,1)
<i>T. laxmannii</i>	(0,6-)0,8-1,3(-2,1)	2-4(-7)	(5,5-)8-10(-18)	gleichmäßig dünn	1-2(-5)	1-1,8	1	(0,5-)2-4(-6)
<i>T. xglauca</i>	1,1	5-19	13	?	2-3	2,0-2,3	1-4	0,4-3,3
<i>T. domingensis</i>	1-3(-4)	(3-)4-8(-13)	(5-)7-20(-30)	an Spitze lanzettlich, oft geweihförmig zerteilt	(1-)2(-6)	(1-)1,4-1,8(-2,2)	1	1-3
<i>T. angustifolia</i>	1-3	(3-)5-8(-10)	(6-)12-20(-35)	an Spitze schwach lanzettlich, oft gegabelt	(1-)2(-5)	(1,5-)2-2,5(-2,8)	1	(0-)1-4(-9)
<i>T. angustifolia x laxmannii</i>	(0,8-)0,9(-1,0)	3-4	6,5-15,5	gleichmäßig bis schwach verbreitert zur Spitze	1-2	ca. 2	1	(0,5)1-3(4,5)