

2. Teil der elektronischen Beilage zu Bernhardt, K.-G. & Gregor, T. 2019: Vielfalt aus aller Welt – neophytische Typha-Arten in Mitteleuropa. – Kochia 12: 9–113, Berlin.

	Abstand ♀ und ♂ Kolbenabschnitt [cm]	Länge ♀ Kolben [cm]	Tragblätter der ♀ Blüten	Farbe reifer ♀ Kolben	Narbe	Samenlänge [mm]	Besonderheiten
<i>T. orientalis</i>	0	4,5-15	fehlen	kastanienbraun bis braun	spatulat	1,2	
<i>T. latifolia</i>	0(-0,5)	(6-)10-15(-30)	fehlen	dunkel- bis schwarzbraun	länglich oval bis lanzettlich	(0,95-)1,2-1,4(-1,8)	
<i>T. shuttleworthii</i>	0	(6-)9-11(-17)	fehlen	silbergrau	oval bis rhombisch, schief trichterförmig	(0,6-)0,7-0,9	Haare überragen ♀ Kolben
<i>T. minima</i>	(0-)0,7(-2,1)	(1,1-)2-3(-6)	haarförmig, Spitzenregion spatelförmig	hellbraun	fädig	0,7-0,9	Laubblätter meist nur an sterilen Trieben / Haare der ♀ Kolben an Spitze keulig bis kugelig
<i>T. laxmannii</i>	(0,5-)2-4(-6)	(2-)3-5(-13)	haarförmig, Spitzenregion etwas verbreitert [kaum von Haaren unterscheidbar]	hellbraun	breit rhombisch	(0,95-)1-1,2(-1,4)	
<i>T. xglauca</i>	0,4-3,3	14-27	haarförmig, braun-farblos [kaum von Haaren unterscheidbar]	mittelbraun	fädig, rinnig	1,1	Pollen z. T. verkümmert
<i>T. domingensis</i>	1-3	(5-)7-20(-30)	haarförmig, Spitze lanzettlich, aufgesetztes weißes Spitzchen	zimtbraun	fädig, rinnig	(0,6-)0,8-1,1(-1,2)	
<i>T. angustifolia</i>	(0-)1-4(-9)	(6-)12-20(-35)	haarförmig, Spitze unregelmäßig spatelförmig, abgerundet, ausgerandet bis gelappt oder spitz	mittelbraun	fädig, rinnig	(0,6-)0,8-1,1(-1,2)	
<i>T. angustifolia x laxmannii</i>	(0,5)1-3(4,5)	2,5-8	an der Spitze gleichmäßig bis schwach verbreitert	hell- bis mittelbraun	lanceolat	0,9-1,1	